


Onrust, oornecrosis bij biggen

In de nazomer en herfst is er vaak een toename te constateren van bedrijven die problemen hebben met oorbijten/oornecrose bij gespeende biggen. De mate waarin het probleem voorkomt, verschilt per bedrijf. De doorbloeding van het weefsel raakt verstoort en er vindt afsterving plaats van het weefsel bij de oorrand.

In de meeste gevallen begint het bij een beperkt aantal dieren (dieren zijn onrustig en vertonen agressie), maar wordt vervolgens snel overgenomen door andere dieren. De irritatie door de jeuk speelt hierbij een rol. Meerdere factoren (management, klimaat, voeding en gezondheid) spelen een rol in de mate van het voorkomen van oorbijten/oornecrose.

In het najaar zijn er vaak meer problemen door de grote verschillen in dag- en nachttemperatuur. Hierdoor wordt er te hard geventileerd of valt de luchtstroom direct op de dieren in plaats van in het gangpad. Tocht zorgt voor irritatie bij de biggen en kan leiden tot bijtgedrag bij de biggen. Om het gedrag van de dieren te bekijken is het daarom ook belangrijk om eens op niet gebruikelijke tijden in de stal te gaan kijken. Andere oorzaken die kunnen leiden tot een gevoel van onbehagen zijn: gebrek aan ligruimte, te hoge bezettingsdichtheid, te weinig of fout geplaatste eetplaatsen, mengen van dieren, abrupte voerovergangen, te weinig water of van slechte kwaliteit, te vroeg spenen.



Om problemen te voorkomen zijn de volgende maatregelen van belang:

- Controleren stalklimaat;
- Voldoende/goede eetplaatsen aanbieden;
- Voldoende schoon drinkwater aanbieden;
- Geen te hoge hokbezetting;
- Tomen bij elkaar houden, mengen van tomen leidt altijd tot agressie om rangorde te bepalen;
- Zorgen voor een optimale voeropname, abrupte voerovergang vermijden.

Om de overschakeling qua voer zo klein mogelijk te houden, adviseren wij om tot drie dagen na spenen door te gaan met de **Arkerwean (prestarter)**. Een smakelijk voeder wat de biggen kennen vanuit de kraamstal en zorgt voor een zo hoog mogelijke voeropname na het spenen. Vanaf drie dagen na spenen adviseren wij om speenvoer te verstrekken tot 17 dagen.

Jacco Vessies
Nutritionist